Raccomandazioni Aifa per la terapia domiciliare del Covid-19

2^ Edizione 2022

ASSIMEFAC

Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e di Comunità

A cura di Leonida Iannantuoni e Giovanni B. D'Errico

Raccomandazione Aifa per la terapia domiciliare del COVID-19

PRESENTAZIONE

Cari Colleghi,
sono passati pochi mesi dalla presentazione della prima edizione della guida "Covid-19 Raccomandazioni Aifa per la terapia domiciliare del Covid 19" che si ravvede l'impellenza di un aggiornamento della stessa.
I numeri pandemici di quest'ultimo periodo, pur di fronte ad un numero ancora elevato di decessi, fanno prevedere un raffreddamento dei casi ma la pandemia da SARS-Cov2, per quanto in fase di regressione, continua a rappresentare una sfida e pone dubbi prospettici su quello che sarà nel prossima stagione autunnale/invernale.

L'ASSIMEFAC, attenta ai bisogni dei Colleghi, ha lasciato invariato l'impianto della precedente edizione arricchendola di nuovi paragrafi e schede, ivi compreso un fac-simile del Piano Terapeutico che il Medico di Medicina Generale deve compilare, corredato delle opportuni istruzioni.
Anche in questo caso, la nostra unica gratificazione è il sapere di esserVi stati utili nel quotidiano.

Nunzia Pia Placentino
Presidente ASSIMEFAC

Leonida Iannantuoni
Presidente CTS ASSIMEFAC

Bibliografia

- Ema 743927/2021, 16/12/2021
- Aifa.gov.it comunicato 684 28/01/22
- Farmaci.agenziafarmaco.gov.it 08/02/2022
- www.doctor33.it 25/04/2022

Raccomandazioni Aifa per la terapia domiciliare del COVID-19

INTRODUZIONE

Nell'infezione da coronavirus ci sono due fasi:

- Fase prima o della replicazione virale: i danni sono direttamente causati dal virus stesso
- fase seconda o fase infiammatoria: i danni sono provocati anche dalla nostra stessa risposta immunitaria. Il farmaco per essere efficace deve essere assunto entro i **primi 5 giorni** dalla positività (fase della replicazione virale) in quanto è in tale periodo che ha il suo massimo effetto.

L' OMS, in un articolo pubblicato su 'The Bmj', raccomanda l'associazione nirmatrelvir-ritonavir (Paxlovid) per i pazienti con Covid-19 non gravi, ma ad alto rischio di progressione severa della patologia e, quindi, di ricovero in ospedale, tra questi: pazienti non vaccinati, anziani e/o immunosoppressi.

Il Paxlovid «rappresenta probabilmente la scelta migliore perché può prevenire più ricoveririspetto alle terapie alternative, ha un minor rischio di potenziali effetti avversi rispetto a molnupiravir», altro antivirale orale anti-Covid, «ed è più facile da somministrare rispetto aitrattamenti per via endovenosa come remdesivir e anticorpi monoclonali».

Nei pazienti Covid a basso rischio, l'impiego di Paxlovid è sconsigliato poiché i benefici non sono significativi. Si segnala che, al momento, non ci sono dati sperimentali che ne suggeriscano l'impiego in malati con Covid-19 grave.

La raccomandazione per Paxlovid si basa sui dati di due studi randomizzati e controllati che hanno coinvolto 3.100 pazienti.

In questi trial «l'evidenza ad alta certezza ha indicato poco o nessun rischio di effetti avversi che portano all'interruzione del farmaco, l'evidenza di certezza moderata ha mostrato che nirmatrelvir-ritonavir ha ridotto i ricoveri ospedalieri (84 in meno ogni 1.000 pazienti), mentre l'evidenza a bassa certezza non ha suggerito differenze importanti per quanto concerne la mortalità ».

In caso di impossibilità o controindicazioni alla prescrizione di nirmatrelvir/ ritonavir nei pazienti adalto rischio è raccomandabile consultare specialisti (infettivologi/pneumologi) per utilizzo di anticorpi monoclonali (sotrovimab), antivirali per e.v. (remdesivir), antivirali per os (monlupiravir).

PAXLOVID

«Medicinale soggetto a prescrizione medicada rinnovare volta per volta (RNR)»". È quanto evidenziato nella Determina del 15 aprile 2022 dell'AgenziaItaliana del Farmaco, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.



PRESCRIZIONE

Prescrizione del Paxlovid da parte dei Medici i Medicina Generale

A partire dal 21 aprile i Medici di Medicina Generale possono prescrivere il farmaco antivirale **Paxlovid** (a base di nirmatrelvir/ritonavir) per il trattamento precoce della malattia da Sars Cov-2.

Il farmaco è indicato per il trattamento di pazienti adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione severa, come ad esempio i pazienti affetti da patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave.

Il trattamento deve essere iniziato il più precocemente possibile, e comunque entro **5 giorni** dall'insorgenza dei sintomi. La prescrizione del farmaco richiede un'anamnesi farmacologica preventiva, per escludere la presenza di eventuali interazioni con farmaci assunti contemporaneamente dal paziente.
La prescrizione del Paxlovid è consentita sia da parte di tutti i centri specialistici Covid-19 individuati dalla regioni che da parte dei Medici di Medicina Generale.

La prescrizione da parte del Medico di Medicina Generale avviene previa compilazione di un **Piano terapeutico** dematerializzato e/o cartaceo, tale piano terapeutico è mirato a sostenere l'appropriatezza d'uso e a fornire strumenti utili alla verifica delle interazioni incompatibili con l'assunzione di Paxlovid.

Con la ricetta del Medico di medicina generale il paziente potrà ritirare il farmaco direttamente in farmacia, senza costi suo carico e senza aggravi per il SSN. La distribuzione della rete delle farmacie (tramite la cosiddetta distribuzione per conto) avverrà gratuitamente da parte di farmacisti e grossisti, grazie a un Protocollo d'intesa ("Documenti correlati") tra Ministero della salute, AIFA e rete delle farmacie (Farmacie Unite) e dei distributori farmaceutici (Federfarma Servizi e A.D.F.).

La prescrizione effettuata dal Medico di medicina generale sarà monitorata tramite il sistema di ricetta elettronica, mentre per i trattamenti prescritti dai centri COVID-19 individuati dalle Regioni e P.A. rimane attivo il registro di monitoraggio AIFA.



Compiti del medico di Medicina Generale

1. **Deve compilare il piano terapeutico (PT) in forma dematerializzata sul sistema TS.** Al termine della compilazione viene rilasciato dal SistemaTS il **protocollo del PT** da riportare in ricetta**.** Nel portale del SistemaTS è disponibile l'applicazione web per la compilazione del PT.

   In alternativa alla compilazione del PT in maniera informatizzata, puo' compilare il PT cartaceo.

2. **Deve compilare la ricetta dematerializzata** (DM 2 NOV 2011) per tale farmaco inserendo:
   - unicamente l'AIC **049853017** e non altri identificativi indicanti lo stesso farmaco prodotto in siti esteri;il gruppo di equivalenza per tale farmaco non esiste, essendo un farmaco di classe Cnn;
   - non sostituibilità del farmaco;
   - codice motivazione "4" Non art 15, comma 11-bis;
   - il protocollo del PT rilasciato dal SistemaTS, se compilato in maniera informatizzata (cfr punto 1); se il PT è stato compilato in maniera cartacea non deve essere indicato nessun protocollo, in modo da non bloccare la prescrizione dematerializzata che deve comunque sempre essere effettuata.

Compiti del farmacista

1. Deve erogare la ricetta dematerializzata in distribuzione per conto (DPC).

Al fine di permettere l'erogazione del farmaco, il farmacista può inserire uno dei seguenti dati, a seconda della confezione dispensata:

- AIC **049853017** e codice targa del farmaco presente sulla fustella, valido per il farmaco prodotto in Italia, oppure
- AIC **700058783** senza codice targa del farmaco, valido per il farmaco prodotto in siti esteri.

NB. il codice 700058783, utilizzato nelle banche dati dei gestionali di farmacia, rappresenta la decodifica del codice E07302010 con cui sono censite le confezioni di Paxvolid prodotte nel sito non italiano.

Per ulteriori informazioni: https://www.aifa.gov.it/-/prescrizione-paxlovid-mmg

Da ricordare

- **Antinfiammatori:** si possono utilizzare come sintomatici nelle fasi iniziali dell'infezione.
- **Antibiotici**: da utilizzare esclusivamente quando si sospetta una complicanza batterica e non come terapia del covid.
- **Cortisonici**: sono sconsigliati nelle fasi iniziali dell'infezione mentre si possono utilizzare nelle fasi piu' avanzate in cui vi è ipossia e necessità di ossigenoterapia.
- **Eparina a basso peso molecolare**: Si tratta di un farmaco da assumere nel paziente allettato o con ridotta mobilità.

ALGORITMO TERAPEUTICO



Raccomandazioni Aifa per la terapia domiciliare del COVID-19

INDICAZIONI

Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo una diagnosi di COVID-19 e, comunque, entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi.

POSOLOGIA

I due principi attivi del medicinale, nirmatrelvir (PF-07321332) e ritonavir, disponibili sotto forma di compresse separate, devono essere assunti insieme due volte al giorno per 5 giorni.

CONTROIDICAZIONI E PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Allergia nota al nirmatrevil e/o al ritonavir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Paxlovid.

Età pediatrica
NON somministrare il farmaco in bambini e/o adolescenti di età inferiore ai 18 anni poiché non esistono studi sulla eventuale tollerabilità e sicurezza in tale fascia di età.

Insufficienza epatica o renale
Il Paxlovid **NON** deve essere impiegato nei pazienti che presentano una funzionalità renale o epatica gravemente ridotta.

Gravidanza ed allattamento
Il medicinale **NON** è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile se non previo utilizzo di un metodo contraccettivo, studi di laboratorio, condotti sugli animali, suggeriscono che dosi elevate di Paxlovid possono influenzare la crescita del feto.
L'allattamento al seno deve essere interrotto durante il trattamento.

EFFETTI COLLATERALI

In termini di sicurezza, gli effetti indesiderati più comuni (fino ad 1 persona su 10) segnalati durante il trattamento e fino a 34 giorni dopo l'ultima dose del medicinale sono:

- disgeusia (alterazione del gusto);
- diarrea
- vomito
- cefalea

Sono state segnalate anomalie degli enzimi epatici, epatite e ittero.

Raccomandazioni Aifa per la terapia domiciliare del COVID-19

Per la possibilità del verificarsi di eventi avversi da moderati/severi a potenzialmente letali, si raccomanda la NON somministrazione del PAXOLIVID in pazienti con terapia farmacologica in atto con le molecole riportate in tabella.

Farmaci antidolorofici	petidina, piroxicam, propossifene
Farmaci cardiologici	ranolazina, amiodarone, bepridil, dronedarone, encainide, flecainide, propafenone, chinidina, warfarin, rivaroxaban, vorapaxar, amlodipina, diltiazem, nifedipina, digossina
Farmaci antineoplastici	neratinib, venetoclax,afatinib, abemaciclib, apalutamide, ceritinib, dasatinib, encorafenib, fostamatinib, ibrutinib, nilotinib, vinblastina e vincristina
Farmaci antibiotici	acido fusidico, rifampicina, atovaquone, claritromicina, eritromicina, bedaquilina, rifabutina, delamanid, sulfametossazolo/ trimetoprim
Farmaci anti allergici	astemizolo, terfenadina, fexofenadina, loratadina
Farmaci anti epilettici	carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, divalproex, lamotrigina
Farmaci psichiatrici	lurasidone, pimozide, clozapina, quetiapina, erba di San Giovanni (Hypericumperforatum), clorazepato, diazepam, estazolam, flurazepam, triazolam, midazolam, aloperidolo, risperidone, tioridazina, alprazolam, buspirone, zolpidem, amitriptilina, fluoxetina, imipramina, nortriptilina, paroxetina, sertralina, desipramina
Farmaci anti emicranici	Diidroergotamina, ergotamina
Farmaci ipocolesterolemizzanti	lovastatina, simvastatina, lomitapide, atorvastatina, fluvastatina, prava statina, rosuvastatina
Farmaci per la disfunzione erettile	avanafil, vardenafil,sildenafil, tadalafil
Farmaci anti emorragici	ergonovina e metilergonovina
Farmaci anti acidi	cisapride
Farmaci anti gotta	colchicina
Farmaci urologici	alfuzosina
Farmaci antimicotici	Itraconazolo, voriconazolo, ketoconazolo
Farmaci antivirali	efavirenz, maraviroc, raltegravir, zidovudina, glecaprevir/pibrentasvir
Farmaci oppioidi	morfina, fentanil, metadone, buprenorfina, norbuprenorfina e altri medicinali simili alla morfina
Farmaci corticosteroidi	betametasone, budesonide, ciclesonide, desametasone, fluticasone, prednisolone, metilprednisolone, mometasone, prednisone, triamcinolone
Farmaci ormonali	levotiroxina
Contraccetivi orali	etinilestradiolo

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Domande e risposte su Paxlovid per gli operatori sanitari

Cos'è Paxlovid?

Paxlovid è un farmaco antivirale a base di due principi attivi, nirmatrelvir (PF-07321332) e ritonavir, per il trattamento precoce della malattia COVID-19.

In quali casi è indicato?

È indicato per il trattamento di pazienti adulti (età ≥18 anni) con infezione confermata da SARS-CoV-2 che:

a) **non necessitano di ossigenoterapia**;

b) **sono a elevato rischio di progressione a COVID-19 severa** (pazienti oncologici, con malattie cardio- cerebrovascolari, con diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave).

Quando va avviato il trattamento?

Il trattamento deve essere iniziato il più precocemente possibile, e co-munque **entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi**.

Ci sono farmaci che potrebbero interagire con Paxlovid?

Sì, e per questa ragione si raccomanda **un'adeguata anamnesi farmacologica** per escludere la presenza di eventuali interazioni con farmaci assunti contemporaneamente dal paziente.

Per le interazioni farmacologiche si può fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del farmaco (par. 4.3, 4.4, 4.5) e al sito dell'Università di Liverpool "COVID-19 Drug Interactions" .

Come si assume Paxlovid?

Il trattamento con Paxlovid prevede l'assunzione di due compresse di nirmatrelavir e di una di ritonavir **ogni 12 ore per 5 giorni**. Le tre compresse devono essere assunte insieme, deglutite intere e non ma- sticate, né spezzate o frantumate. Possono essere assunte con il cibo o lontano dai pasti.

Qual è il contenuto di una confezione di Paxlovid?

Le compresse rivestite con film di Paxlovid sono disponibili in 5 blister, ognuno per una dose giornaliera, per un totale di 30 compresse con- fezionate in una scatola. Ogni blister è schematicamente suddiviso in due segmenti con il simbolo del sole e della luna contenenti ognuno 2 compresse di PF-07321332 (compressa rosa ovale) e 1 di ritonavir (compressa a forma di capsula, bianca) da assumere, rispettivamente,al mattino e alla sera.

Sono previsti dosaggi differenziati per pazienticon compromissione renale?

I pazienti con compromissione renale moderata devono assumere **1 compressa di PF-07321332 e 1 di ritonavir ogni 12 ore per 5 giorni**.In caso di compromissione renale grave il farmaco **non è raccomandato**.

È possibile assumere il farmaco in caso di compromissione epatica grave?

No, in tal caso il farmaco **non è raccomandato**.

Ci sono avvertenze speciali per infezione da HIV-1 non controllata o non diagnosticata?

Essendo il ritonavir un farmaco antiretrovirale (app..artenente alla classe degli inibitori della proteasi) può esserci un rischio di sviluppo di resistenza dell'HIV-1 agli inibitori della proteasi HIV in soggetti con infezione da HIV-1 non controllata o non diagnosticata. I pazienti con infezione da HIV (o anche HCV) sottoposti a regimi terapeutici contenenti ritonavir o cobicistat devono continuare i propri trattamenti come previsto.

In caso di peggioramento delle condizioni cliniche il farmaco va interrotto?

No, è raccomandato il completamento dell'intero ciclo di trattamento di 5 giorni anche in caso di ricovero in ospedale per progressione a COVID-19 di grado severo o critico.

Paxlovid può essere assunto in gravidanza?

Non ci sono dati relativi all'uso di Paxlovid in donne in gravidanza. Sebbene la gravidanza non rappresenti una controindicazione all'uso di Paxlovid, quest'ultimo **non è raccomandato durante la gravidanza** e nelle donne in età fertile che non usano un metodo contraccettivo, ameno che le condizioni cliniche rendano necessario il trattamento.

Si può allattare al seno durante il trattamento con Paxolovid?

L'allattamento al seno deve essere interrotto durante il trattamento e, come misura precauzionale, per 7 giorni dopo il completamento di Paxlovid, poiché non è possibile escludere un eventuale rischio per ineonati/lattanti.

È controindicato iniziare una gravidanza durante il trattamento con Paxlovid?

Sì, durante il trattamento con Paxlovid e, come misura precauzionale, 7 giorni dopo il completamento, **non dovrebbe essere intrapresa una gravidanza**.

Quali indicazioni vanno fornite riguardo l'uso dei contraccettivi?

L'uso di ritonavir può **ridurre l'efficacia dei contraccettivi ormonali combinati.** Pertanto durante il trattamento con Paxlovid e fino a un ciclo mestruale successivo all'interruzione del trattamento andrebbe utilizzato un metodo contraccettivo alternativo o aggiuntivo (di barriera).

Quali sono i possibili effetti indesiderati?

Gli effetti indesiderati più comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10) sono alterazione del gusto, diarrea, vomito e mal di testa.

Chi può prescrivere Paxlovid?

Paxlovid può essere prescritto da:

- Medici di Medicina Generale;
- Centri specialistici COVID-19 individuati dalle Regioni.

Dove è possibile ritirare il farmaco?

Con la ricetta del medico di Medicina Generale il farmaco potrà essere ritirato direttamente in farmacia, senza costi a carico del paziente.

Come avviene la prescrizione da parte del Medicodi medicina generale?

La prescrizione da parte del medico di Medicina Generale avverrà me- diante la compilazione di un Piano terapeutico informatizzato mirato a sostenere l'appropriatezza d'uso e a fornire strumenti utili alla verifica delle interazioni incompatibili con l'assunzione di Paxlovid.

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI NIRMATRELVIR/RITONAVIR (PAXLOVID®)

nel trattamento del covid-19 lieve-moderato nei soggetti a rischio non ospedalizzati

Vers. 2 - Aggiornamento del 18/05/2022

Medico prescrittore (cognome, nome)_____

Tel._____ e-mail _____

Paziente (cognome, nome)_____

Data di nascita_____sesso M ☐ F☐_____peso (Kg) _____

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel._____

ASL di residenza_____ Regione_____ Prov._____

Medico di Medicina Generale (se non coincide con il prescrittore)_____recapito Tel. _____

Indicazione autorizzata

Paxlovid è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa.

Condizioni cliniche e criteri di accesso al farmaco

Per avere accesso al farmaco devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ☐ Età ≥18 anni
- ☐ Test molecolare o antigenico positivo per SARS-COV-2 (inserire la data del test:_____)
- ☐ Se sintomatico, esordio dei sintomi da non oltre 5 giorni
- ☐ Soggetto non ospedalizzato per COVID-19
- ☐ Soggetto non in ossigenoterapia (o, in caso di soggetto già in ossigenoterapia per sottostanti comorbidità, non deve richiedere un incremento a seguito del COVID-19)
- ☐ Soggetto non in stato di compromissione renale severa (eGFR>30 mL/min)
- ☐ Soggetto non in stato di compromissione epatica severa (Classe Child-Pugh A-B)

Presenza di almeno uno tra i seguenti fattori di rischio

- ☐ Patologia oncologica/oncoematologica in fase attiva
- ☐ Insufficienza renale cronica
- ☐ Broncopneuomopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2)
- ☐ Immunodeficienza primaria o acquisita
- ☐ Obesità (BMI ≥30)
- ☐ Malattia cardio-cerebrovascolare (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiomiopatia, ipertensione con concomitante danno d'organo, ictus)
- ☐ Diabete mellito non compensato (HbA1c>9.0% 75 mmol/mol) o con complicanze croniche
- ☐ Età >65 anni
- ☐ Epatopatia cronica
- ☐ Emoglobinopatie
- ☐ Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative

Verifica accurata di tutte le possibili interazioni farmacologiche.

□ In considerazione delle numerose interazioni farmacologiche associate a Paxlovid, si raccomanda di indagare adeguatamente l'anamnesi farmacologica e di fare riferimento all'RCP del farmaco (par. 4.3, 4.4, 4.5; https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product- information_it.pdf) e al sito disponibile al seguente indirizzo: https://www.covid19-druginteractions.org/. Una versione adattata e una possibile guida alla gestione delle principali interazioni è disponibile, in italiano, al sito: https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/ptr/tabella-interazioni-paxlovid.pdf/@@download/file/Tabella%20interazioni%20Paxlovid.pdf "

- □ Assenza di gravidanza in atto
- □ Non sono disponibili dati riguardo all'uso di Paxlovid nelle donne incinte che diano indicazioni sul rischio associato al medicinale di effetti avversi sullo sviluppo. In caso di paziente donna potenzialmente fertile, la donna accetta di evitare di iniziare una gravidanza durante il trattamento con Paxlovid e, come misura precauzionale, per 7 giorni dopo il completamento di Paxlovid.
- □ L'uso di ritonavir può ridurre l'efficacia dei contraccettivi ormonali combinati. In caso di paziente donna potenzialmente fertile, la donna accetta di utilizzare un metodo contraccettivo alternativo efficace o un metodo contraccettivo di barriera aggiuntivo durante il trattamento con Paxlovid e fino a un ciclo mestruale dopo aver interrotto Paxlovid

SCHEDA DI PRESCRIZIONE		
□ **eGFR ≥ 60 ml/min**		
Paxlovid	**Posologia**	**Durata**
Nirmatrelavir (PF-07321332), 150 mg compresse	2 compresse ogni 12 ore	5 giorni
Ritonavir, 100 mg compresse	1 compressa ogni 12 ore	
□ **eGFR da ≥ 30 a < 60 mL/min***		
Paxlovid	**Posologia**	**Durata**
Nirmatrelavir (PF-07321332), 150 mg compresse	1 compressa ogni 12 ore	5 giorni
Ritonavir, 100 mg compresse	1 compressa ogni 12 ore	

Le due compresse di nirmatrelvir (PF-07321332) e la compressa di ritonavir devono essere assunte insieme per via orale ogni 12 ore per 5 giorni.
Le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, spezzate o frantumate. Possono essere assunte con il cibo o lontano dai pasti.
Il trattamento deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di COVID-19 ed entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Si raccomanda il completamento dell'intero ciclo di trattamento di 5 giorni anche se il paziente richiede il ricovero in ospedale per progressione a COVID-19 di grado severo o critico dopo l'inizio del trattamento con Paxlovid.

*** Avvertenza speciale per i pazienti con compromissione renale moderata**.
Nei pazienti con compromissione renale moderata (eGFR da ≥ 30 a < 60 mL/min), la dose di Paxlovid deve essere ridotta a PF- 07321332/ritonavir 150 mg/100 mg ogni 12 ore per 5 giorni per evitare la sovraesposizione.
Il blister giornaliero contiene due parti separate, ciascuna contenente due compresse di PF-07321332 e una compressa di ritonavir, corrispondente alla somministrazione giornaliera alla dose standard. Pertanto, i pazienti con compromissione renale moderata devono essere avvisati del fatto che deve essere assunta soltanto una compressa di PF-07321332 con la compressa di ritonavir ogni 12 ore.

Per le modalità di prescrizione fare riferimento all'RCP del prodotto
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_it.pdf

Data_____ Timbro e firma del medico prescrittore

ASSIMEFAC

Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e di Comunità

www.assimefac.it